

# ЧТО ПРИЧИНЯЕТ ОБЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ



## Кто болеет энтеровирусными инфекциями?

Заболеваемость в Хабаровском крае носит летне-осеннюю сезонность. Восприимчивость людей к вирусу высокая. Дети болеют значительно чаще, чем взрослые. В общем количестве больных удельный вес детей составляет обычно 80–90 %, достигая 50 % в возрасте до 5 лет. При нарушениях противовирусного режима и несоблюдении санитарных требований отмечается внутрисистемное распространение и групповое случаи заболеваний в детских организациях и коллективах.

## Как уберечься от инфекции и обеспечить лучший исход болезни?

- употреблять гармонично и безпасную воду, кипяченую или в фабричной расфасовке;
- не использовать для питья воду из фонтанов, озер, рек,
- избегать купания в р. Амур и ее притоках, прудах, заполненных водой карьерах;
- тщательно промывать кипяченой водой овощи, фрукты, зелень;
- соблюдать правила личной гигиены — мыть руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи;
- не реже 1 раза в день, а если в семье имеются дети до 3 лет — два раза в день мыть игрушки моющим средством.

Серьезно относитесь к своему здоровью. В случае появления вышеописанных симптомов заболеваний обращайтесь к врачу.



**Герпангина** проявляется в виде высыпаний на передних дужках нёба, миндалинах, языке и задней стенке глотки, подъема температуры.

## Свойства вирусов

Микробы довольно быстро погибают при температурах свыше 50 градусов (при 60 градусах — за 6–8 мин.) Однако при температуре 37 градусов вирус может сохранять жизнеспособность в течение 50–60 дней, в обычном холодильнике — в течение нескольких недель, в речной воде — до 33 дней.

## Источники инфекции

Источником инфекции (хранителем вируса) является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Наиболее интенсивное выделение вируса во внешнюю среду вместе с фекалиями происходит в первые дни болезни. Обнаруживается вирус в крови и носоглоточном отделяемом. Инкубационный (скрытый) период составляет от 2 до 35 дней, в среднем до 1 недели.

## Как передается инфекция?

Задражение людей происходит в основном фекально-оральным путем — инфицированные вода, продукты питания, грязные руки, игрушки; возможен также воздушно- капельный механизм — чихание, кашель.



## Наиболее частые проявления энтеровирусной инфекции

Энтеровирусный (серозный) менингит — поражение центральной нервной системы. Симптомами этого заболевания являются температура более 38 градусов, головные боли, ригидность (болезненность) при сгибании затылочных мышц. Развитию серозного менингита могут предшествовать такие признаки болезни, как беспокойство, плохой сон, высыпания на кожных покровах, ринит, понс.

## Что такое энтеровирусные инфекции?

**Энтеровирусная лихорадка (малая болезнь)** по частоте распространения занимает первое место среди заболеваний, вызываемых энтеровирусами. Заболевание начинается остро, температура повышается до 38–39 градусов, наблюдается озноб, головная боль, нередко — тошнота и рвота, покраснение зева, гиперемия сосудов склер и конъюнктивы.

# МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ